



# **Veldkeuring**

## **granen, peulvruchten en fijne zaden**

**2010**

NAK, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord; tel. 0527 – 635400; fax. 0527 – 635411

## Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK).

© Copyright 2010 Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK), Emmeloord.

## Voorwoord

De tekst van de aanwijzingen voor de veldkeuring van granen enz. is dit jaar **ongewijzigd**.  
De bijlagen met de raskenmerken zijn uiteraard wel bijgewerkt.

## Inhoud

<b>1. Aangifte</b> .....	6
1.1 Aangifteformulieren .....	6
1.2 Aangiftedata .....	6
1.3 Generatieaanduiding .....	6
1.4 Scheiding en isolatie .....	7
1.5 Perceelsbordjes .....	8
1.6 Rassen in onderzoek .....	8
1.7 Keuring gecertificeerd zaad 2 <sup>e</sup> vermeerdering en importpartijen .....	8
<b>2. Voor- en nacontrole</b> .....	9
2.1 Voorcontrole .....	9
2.2 Nacontrole .....	11
<b>3. Veldkeuring</b> .....	13
3.1 Algemeen .....	13
3.2 Aantal keuringen .....	13
3.3 Splitsing percelen .....	13
3.4 Voorziening prebasis- en basiszaad .....	14
3.5 Tijdstip keuringen .....	14
3.6 Beoordeling rasechtheid .....	14
3.7 Keuring op raszuiverheid .....	15
3.8 Keuring op plantenziekten .....	19
3.9 Keuring op onkruid en vermenging .....	21
<b>4. Keuring hybride granen</b> .....	22
4.1 Keuring chemisch hybride rassen van zelfbevruchtende granen .....	22
4.2 Keuring cytoplasmatisch hybride rassen van rogge .....	22
<b>5. Keuring koolzaad</b> .....	25
5.1 Voorvrucht .....	25
5.2 Tijdstip en aantal keuringen .....	25
5.3 Normen raszuiverheid .....	25
5.4 Nacontrole hybride rassen .....	26
5.5 Samenstelling mengras (rasassociatie) .....	26
<b>6. Keuring vezelhennepe</b> .....	27
6.1 Algemeen .....	27
6.2 Veldkeuring .....	27
<b>7. Keuring maïs</b> .....	28
7.1 Aangifte .....	28
7.2 Veldkeuring .....	28
7.3 Isolatieafstanden .....	29
7.2 Partijkeuring hybride maïs .....	29
<b>8. Keuring standaardzaad van landbouwstambonen</b> .....	30
<b>9. Keuring boekweit</b> .....	31
9.1 Aangifte .....	31
9.2 Veldkeuring .....	31

## Bijlagen

Door de EU-lidstaten gebruikte aanduidingen voor de keuringsgeneraties	A
Raskenmerken van wintertarwe	B
Raskenmerken van zomertarwe	C
Raskenmerken van wintergerst	D
Raskenmerken van zomergerst	E
Raskenmerken van haver	F
Raskenmerken van triticale	G
Raskenmerken van rogge	H
Raskenmerken van erwten	I
Raskenmerken van veldbonen	J
Raskenmerken vlas	K
Raskenmerken koolzaad	L
Kruisbestuivingsschema Brassicaceae	M

## 1. Aangifte

### 1.1 Aangifteformulieren

De aangifte voor de keuring moet geschieden op een daartoe beschikbaar gesteld formulier, waarop de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid moeten worden ingevuld en dat door de aanvrager moet zijn ondertekend.

Indien een aanvrager keuring van teeltmateriaal in een lagere categorie/generatie wenst, dan waarop hij op grond van het gebruikte uitgangsmateriaal recht zou hebben, moet hij dit op het formulier vermelden.

### 1.2 Aangiftegegevens

De aangifte voor de keuring moet uiterlijk op de onderstaand vermelde datum zijn ingediend:

Gewas	Datum
• Winterkoolzaad	1 maart
• Karwij	15 april
• Landbouwstambonen en hennep	1 juni
• Overige gewassen	1 mei
• Maïs en boekweit	15 mei

De vaste commissie kan een eerdere of een latere aangiftedatum vaststellen.

### 1.3 Generatieaanduiding

De generatieaanduiding en de maximaal te behalen generatie zijn hieronder weergegeven.

Categorie	Gewassen
PB <sup>1)</sup>	Alle
BZ <sup>2)</sup>	Alle
C1	Alle
C2	tarwe, gerst, haver, triticale, erwten, veldbonen en vlas
C3	vlas

- 1) De nateelt van prebasiszaad dat direct afkomstig is van kwekerszaad, kan op verzoek van de kweker nog een keer als prebasiszaad worden gekeurd.  
2) Bij vlas wordt basiszaad onderverdeeld in SE en E.

Bij uitgangsmateriaal uit één van de EU-lidstaten moet voor de generatie die maximaal kan worden toegekend, het schema van bijlage A worden aangehouden.

Alle categorieën EU-gecertificeerd materiaal en OESO-partijen basiszaad en gecertificeerd zaad worden zonder bijzondere voorwaarden voor de keuring aangenomen; wel moet van elke partij een monster in de nacontrole worden opgenomen. OESO-partijen prebasiszaad worden voor de keuring aangenomen op voorwaarde dat een monster in de voorcontrole is opgenomen.

## 1.4 Scheiding en isolatie

Bij **prebasis-** en **basiszaad** van zelfbestuivende granen en erwten moet de scheiding tussen twee rassen van hetzelfde cultuurgewas tenminste 1 meter bedragen. Deze scheiding van 1 meter geldt ook ten opzichte van andere graangewassen en erwten.

Bij **gecertificeerd zaad** is de voorgeschreven scheiding 50 cm.

Bij **veldbonen** moet de scheiding bestaan uit drie meter onbeplant van het voorste en het achterste gedeelte van de beide grensrijen

Bij de teelt van hybride rogge hoeft geen scheiding te worden aangebracht tussen de randstrook met hersteller en de moederplanten. Voorwaarde is dat bij de oogst minstens een halve meter moederplanten met de hersteller wordt meegeogst.

Bij de kruisbestuivende gewassen gelden de volgende isolatieafstanden ten opzichte van andere rassen van hetzelfde gewas en andere gewassen die gevaar voor kruisbestuiving opleveren:

Soort	PB en BZ	CZ
<b>Winterrogge</b> (m.u.v. hybride rassen)	300 m	250 m
<b>Hybride rassen winterrogge:</b>		
- mannelijk steriele lijnen	1000 m	500 m
- fertiele lijnen	600 m	500 m
Zomerrogge	300 m	250 m
Triticale	50 m	20 m
Kanariezaad	300 m	250 m
Karwij	400 m	200 m
Maïs	200 m	200 m
<b>Koolzaad:</b>		
- conventionele rassen	200 m	100 m
- hybride rassen	500 m	300 m
Mosterd	400 m	200 m
Stambonen	50 m	50 m
Veldbonen	200 m	100 m
Blauwmaanzaad	50 m	50 m
Boekweit	400 m	200 m
<b>Vezelhennep:</b>		
- Tweehuizige rassen	400 m	200 m
- Eenhuizige rassen	5000 m	1000 m

Percelen winterrogge die op minder dan 300 m, respectievelijk 250 m van zomerrogge voorkomen of omgekeerd, komen voor goedkeuring in aanmerking indien ze niet gelijktijdig bloeien en de afstand tussen de percelen tenminste 80 m is.

De minimumafstanden behoeven niet in acht te worden genomen, indien er naar het oordeel van de NAK voldoende bescherming tegen kruisbestuiving aanwezig is.

### **1.5 Perceelsbordjes**

De teler moet vóór aanvang van de keuring bij het perceel een bordje plaatsen met daarop de perceelaanduiding. De bordjes moeten zodanig worden geplaatst dat ze ook in een volledig uitgeteeld gewas goed zichtbaar zijn.

### **1.6 Rassen in onderzoek**

Een ras in onderzoek kan voor de keuring worden aangenomen indien:

- het officieel in onderzoek is in Nederland of in een andere EU-lidstaat,
- de kweker/vertegenwoordiger het ras bij de NAK heeft aangemeld voor de productie van beproevingsmateriaal en/of voortkweekingsmateriaal,
- de kweker/vertegenwoordiger een voorlopige rasbeschrijving en een deel van het registratiemonster aan de NAK ter beschikking heeft gesteld.

### **1.7 Keuring gecertificeerd zaad 2<sup>e</sup> vermeerdering en importpartijen**

Percelen tarwe, gerst, haver, triticale, erwten en veldbonen, die zijn ingezaaid met gecertificeerd zaad 1<sup>e</sup> vermeerdering, kunnen voor keuring worden aangenomen als van het uitgangsmateriaal een monster in de nacontrole ligt. Dit geldt ook voor importpartijen die voor verdere vermeerdering worden gebruikt. De houder van de partij moet de NAK tijdig verzoeken een monster te nemen (monster grootte is 1 kg).

Indien er geen monster in de nacontrole is opgenomen, kan de NAK het perceel onder de volgende voorwaarden voor de keuring aannemen:

- de NAK voert twee veldkeuringen uit,
- bij buitenlandse partijen vraagt de NAK de resultaten van de nacontrole op in het land van herkomst,
- bij Nederlandse partijen wordt de rasechtheid beoordeeld door 10 aren/pluimen uit het perceel te vergelijken met aren/pluimen van het controleveld.

## 2. Voor- en nacontrole

### 2.1 Voorcontrole

De voorcontrole wordt uitgevoerd aan partijen stamzaad of kwekerszaad van rassen die:

- op de Rassenlijst van Nederland, de EU of een andere lidstaat zijn geplaatst;
- in Nederland of een ander land in onderzoek zijn voor inschrijving in het Rassenregister en/of plaatsing op de Rassenlijst;
- om andere redenen tot de keuring zijn toegelaten.

De resultaten van de voorcontrole zijn maatgevend voor de maximaal toe te kennen generatie bij de veldkeuring. De monsters worden uitgezaaid op het centraal controleveld van de NAK en beoordeeld op rasechtheid en raszuiverheid. Aanleg, beoordeling en normstelling zijn als volgt geregeld.

#### 2.1.1 Granen en peulvruchten

Van elk nieuw ingezonden monster wordt een voorcontroleveldje aangelegd van:


- 20 m<sup>2</sup> bij granen, bonen en fijne zaden (m.u.v. vlas)
- 40 m<sup>2</sup> bij erwten, kapucijners en schokkers.

Voor de controle op de rasechtheid wordt daarnaast een veldje van 10 m<sup>2</sup> ingezaaid met het vorig jaar ingezonden monster. Bij rassen in onderzoek wordt alleen een voorcontrolemonster uitgezaaid.

De kwekers stellen een monster van 1,5 kg beschikbaar van elk ras waarvan in Nederland zaaizaad wordt vermeerderd tot prebasiszaad. Indien per ras meerdere partijen voor vermeerdering tot prebasiszaad worden bestemd, wordt van elke herkomst een monster genomen.

Partijen kwekerszaad waaruit meerdere jaren prebasiszaad wordt geteeld, hoeven slechts één keer in de voorcontrole te worden opgenomen. Dergelijke partijen moeten worden geïdentificeerd met kwekerszaadlabels waarop het voorcontrolenummer is aangegeven. De monsters worden genomen van de laatste generatie voorafgaand aan prebasiszaad. Deze generatie is in het volgende schema omlijnd.

Schema voor generatieaanduiding bij granen en peulvruchten



<sup>1)</sup> 1 of meer generaties aan te duiden door de kweker

<sup>2)</sup> de nateelt van prebasiszaad dat direct afkomstig is van kwekerszaad kan op verzoek van de kweker nog een keer als prebasiszaad worden gekeurd.

Monsters die in de voorcontrole zijn opgenomen moeten dezelfde partijaanduiding hebben als die waaronder de productie tot prebasiszaad plaatsvindt.

### Eisen voorcontrole granen en peulvruchten

De veldjes worden beoordeeld op de hoofdkenmerken lengte, kleur en vorm. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de veldkeuring. Bij de erwten wordt bovendien het al of niet gevlekt zijn van de steunblaadjes beoordeeld.

Voor de voorcontrole gelden per 20 m<sup>2</sup> de volgende normen voor selecteerbaarheid

Categorie	Granen (m.u.v. triticale) en peulvruchten	Triticale
PB	4	8
BZ	8	16

Indien per 20 m<sup>2</sup> meer dan 8 respectievelijk 16 afwijkers voorkomen dan wordt de betreffende herkomst maximaal als CZ goedgekeurd, mits het materiaal bij veldkeuring aan de eisen voldoet.

Bij de voorcontrole wordt tevens gelet op de volgende kleine kenmerken:

- gerst: - het kort of lang behaard zijn van de rachilla
- haver: - het al dan niet bewimperd zijn van de bladranden
- het al dan niet behaard zijn van de bovenste halmknoop en directe omgeving
- het al dan niet bewast zijn van het kroonkafje van het toppakje
- erwten: - de vorm van de geheel gevulde peulen, als de zaden volgroeid zijn
- veldbonen: - de kleur van het hilum.

De normen voor de kleine kenmerken zijn als volgt:

Categorie	Max. aantal afwijkers	Opmerkingen
PB en BZ	1 per 200	Bij 2 afwijkers worden nog eens 200 planten onderzocht. In dat geval is de norm 3 per 400
C1	3 per 200	
C2	4 per 200	

Bij de gewassen tarwe en haver wordt bovendien rekening gehouden met de korrelkleur. Per 500 gram mogen maximaal de volgende aantallen afwijkende zaden voorkomen:

Categorie	Tarwe	Haver
Prebasiszaad	5	8
Basiszaad	8	12
Gecertificeerd zaad 1 <sup>e</sup> vermeerdering	25	40
Gecertificeerd zaad 2 <sup>e</sup> vermeerdering	50	75

Daarnaast wordt de tarwe oriënterend bekeken op de vulling van het bovenste halmlid.

### 2.1.2 Vlas

Bij vlas wordt de voorcontrole uitgevoerd op de generatie voorafgaand aan prebasiszaad. Het nieuw ingezonden monster wordt uitgezaaid op een veldje van 5 m<sup>2</sup>. Voor de controle op de rasechtheid wordt daarnaast een veldje van 5 m<sup>2</sup> ingezaaid met het monster dat het vorige jaar van dat ras is ingezonden.

De raszuiverheid van de veldjes wordt beoordeeld aan de hand van de volgende kenmerken:

- bloemkleur (blauw, wit, roze, rood en violet)
- bloemgrootte
- bloemvorm
- kleurschakering
- kleur helmknoppen
- lengte plant
- gevlektheid van de kelkbladen
- beharing van de valse tussenschotten.

Per onderdeel gelden de volgende normen:

**a. Bloemkleur**

Indien per 5 m<sup>2</sup> niet meer dan 20 planten worden gevonden die op bloemkleur afwijken, wordt het materiaal selecteerbaar geacht voor prebasis- of basiszaad.

**b. Lengte plant, bloemvorm, bloemgrootte, kleurschakering (licht/donker blauw, rood, roze, violet) en kleur helmknoppen**

Indien niet meer dan 150 afwijkers voorkomen per veldje kan het materiaal nog als prebasis- of basiszaad worden gekeurd.

**c. Beharing van de valse tussenschotten en de gevlektheid van de kelkbladen**

Ten minste 500 planten worden beoordeeld op beharing van de valse tussenschotten en gevlektheid van de kelkbladen.

Op 2000 planten mogen t.a.v. deze kenmerken maximaal 10 afwijkers voorkomen.

## 2.2 Nacontrole

Van alle goedgekeurde partijen prebasis- en basiszaad legt de NAK een nacontrole aan. Dit geldt ook voor gecertificeerd zaad 1<sup>e</sup> vermeerdering, dat wordt gebruikt voor de teelt van gecertificeerd zaad 2<sup>e</sup> vermeerdering. De resultaten worden gebruikt ter ondersteuning van de veldkeuring. In Nederland geproduceerde partijen gecertificeerd zaad, die niet verder worden vermeerderd, worden steekproefsgewijs (10%) nagecontroleerd; in dit geval is de nacontrole bedoeld als systeemcontrole op de veldkeuring en de certificering.

De nacontrole veldjes worden uitgezaaid naast het standaardmonster van het ras en beoordeeld op rasechtheid en raszuiverheid. De veldjesgrootte is voor alle gewassen 10 m<sup>2</sup> met uitzondering van het vlas waar de veldjes 5 m<sup>2</sup> zijn.

Voor de beoordeling op de **rasechtheid** wordt het veldje visueel vergeleken met het standaardmonster van het ras. Dit gebeurt aan de hand van de kenmerken vroegheid, lengte, kleur en vorm van het totale veldje. Is een monster prebasis- of basiszaad niet rasecht dan worden de corresponderende nateelten afgekeurd. Is een monster onvoldoende stabiel (duidelijk vroeger of later dan het standaardmonster) dan wordt, na overleg met de kweker van het ras, de nateelt afgekeurd of maximaal goedgekeurd als gecertificeerd zaad.

Bij de beoordeling op de **raszuiverheid** wordt gekeken naar planten die duidelijk afwijken van het gemiddelde van het ras. De raszuiverheid wordt bepaald aan de hand van de kenmerken lengte, kleur, vorm en vroegheid.

Daarnaast worden bij onderstaande gewassen de volgende zogenaamde kleine kenmerken beoordeeld:

<b>Gewas</b>	<b>Kenmerk</b>
haver	<ul style="list-style-type: none"><li>- bewimpering van de bladranden</li><li>- beharing bovenste halmknoop</li><li>- bewassing kroonkafje van het toppakje</li></ul>
vlas	<ul style="list-style-type: none"><li>- beharing valse tussenschotten</li><li>- gevlektheid van de kelkblaadjes</li></ul>

### 3. Veldkeuring

#### 3.1 Algemeen

Bij de veldkeuring worden de volgende onderdelen beoordeeld:

- rasechtheid
- raszuiverheid
- plantenziekten die met het zaaizaad kunnen overgaan
- onkruiden en vermengingen die moeilijk uitschoonbaar zijn
- isolatieafstanden bij kruisbestuivende gewassen/scheiding.

Bij de keuringen wordt tevens rekening gehouden met de resultaten van het corresponderende controleveldje c.q. de voorcontrole op het centraal controleveld van de NAK.

Voor de onderdelen raszuiverheid, plantenziekten en vermengingen moeten op het veldkeuringsrapport respectievelijk de aantallen rasafwijkers, zieke planten en planten van andere gewassen worden aangegeven. De aantallen moeten worden vastgesteld op basis van minimaal drie tellingen die op diverse plaatsen in het perceel moeten worden uitgevoerd; per telling wordt 100 m<sup>2</sup> beoordeeld. Het totaal aantal rasafwijkende planten wordt op het veldkeuringsrapport vermeld.

#### 3.2 Aantal keuringen

De voor keuring aangegeven percelen moeten tenminste het hieronder aangegeven aantal malen zijn beoordeeld:

Soort en categorie	Aantal beoordelingen
<b>Granen en veldbonen:</b>	
– Prebasiszaad en basiszaad	2x
– Gecertificeerd zaad <sup>1)</sup>	1x
Landbouwstambonen, koolzaad, mosterd en karwij	2x
<b>Hybride maïs:</b>	
– Ingeteeld en enkele hybriden	4x
– Dubbele hybriden	3x
Erwten, vlas en blauwmaanzaad	1x
Overige gewassen	1x

1) Geldt voor granen alleen bij de veldkeuring wanneer tevens rekening wordt gehouden met de op het centrale controleveld aangelegde controlecultuur.

#### 3.3 Splitsing percelen

Splitsing van percelen wordt toegestaan met uitzondering van de gezondheidstoestand van het gewas en van het voorkomen van wilde haver. Splitsing kan direct in overleg met de keurmeester worden geregeld onder voorwaarde dat:

- het perceel een aaneengesloten geheel blijft
- de teler binnen drie dagen een duidelijke markering aanbrengt.

Elk gedeelte wordt hierna afzonderlijk gekeurd.

### **3.4 Voorziening prebasis- en basiszaad**

Door afkeuring, degradatie of anderszins van een perceel/partij in Nederland kan het areaal prebasis- en basiszaad zodanig teruglopen dat de zaaizaadvoorziening van een ras in gevaar komt. Om dit op te vangen kan de kweker of zijn vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek tot promotie indienen om de verloren gegane percelen/partijen te vervangen.

De NAK verifieert of het verzoek aan de voorwaarden voor promotie voldoet, te weten:

- de voor promotie voorgedragen percelen/partijen moeten voldoen aan de eisen van de generatie die na de promotie zal worden toegekend
- het voorgedragen areaal c.q. de hoeveelheid moet in principe overeenkomen met het verloren gegane areaal c.q. de verloren gegane hoeveelheid
- het uitgangsmateriaal van de betreffende percelen/partijen mag niet reeds eerder zijn gepromoveerd
- er kan maximaal één generatie worden opgewaardeerd.

Bij vlas is het mogelijk gecertificeerd zaad 2<sup>e</sup> vermeerdering te promoveren naar 1<sup>e</sup> vermeerdering. Voorwaarde is dat het gaat om vervanging van verloren gegane percelen/partijen basiszaad die niet door gecertificeerd zaad 1<sup>e</sup> vermeerdering kunnen worden vervangen.

### **3.5 Tijdstip keuringen**

De keuringen moeten zodanig worden uitgevoerd dat alle keuringsonderdelen goed zijn te beoordelen. Bij de granen moet de keuring worden uitgevoerd op een tijdstip dat het gewas volledig is uitgegroeid, de raszuiverheid goed is te beoordelen en een goede indruk kan worden verkregen over het al dan niet voorkomen van wilde haver. Bij de andere gewassen moet de keuring plaatsvinden tijdens de bloei.

Bij vlas en stambonen vindt de keuring, respectievelijk de eerste keuring, plaats tijdens de bloei van het gewas. In verband met de beoordeling op plantenziekten vindt bij stambonen de tweede keuring plaats tijdens de afrijping van het gewas.

### **3.6 Beoordeling rasechtheid**

Bij de beoordeling van de rasechtheid moet men zich richten naar de officiële rasbeschrijving. Om na te gaan of het ras met de rasbeschrijving overeenkomt, moeten per perceel tenminste 10 planten worden gecontroleerd aan de hand van de raskenmerken die bij de voorcontrole worden gebruikt. In twijfelgevallen moet een nadere oriëntering plaatsvinden omtrent de typische raskenmerken, zo mogelijk op rassenproefvelden aan de hand van beschikbare gegevens. Ter oriëntering zijn in de bijlagen B t/m K de belangrijkste raskenmerken van de zelfbestuivende granen, erwten, veldbonen, vlas en koolzaad opgenomen.

Bij karwij wordt vlak voor de oogst een aanvullende beoordeling op rasechtheid uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of het ras ten aanzien van de vastzadigheid met de rasbeschrijving overeenkomt. Van de huidige Rassenlijstrassen is alleen het ras Bleija vastzadig.

### 3.7 Keuring op raszuiverheid

#### 3.7.1 Keuring zelfbestuivende gewassen en bonen

De gewassen **tarwe, gerst, haver, Japanse haver (*Avena strigosa*), triticale, erwten, veldbonen, stambonen, vlas en blauwmaanzaad** worden als zelfbestuivers gekeurd.

Bij de beoordeling op raszuiverheid wordt gelet op planten die duidelijk van het ras afwijken op de hoofdkenmerken lengte, kleur en vorm. Planten die iets afwijken van het ras (iets meer of minder was, iets ruimer of dichter geschakeld enz) worden niet als afwijkers beschouwd, tenzij ze ook op een ander kenmerk/andere kenmerken afwijken. Alle planten die 2 aar lengten (pluimlengten) of meer boven de gemiddelde lengte van het gewas uitsteken, worden als rasafwijkers gerekend. Als te kort worden gerekend de planten die aanmerkelijk korter zijn dan de gemiddelde lengte; daarbij worden de zijstengels van de planten buiten beschouwing gelaten.

De raszuiverheid wordt aan de hand van de volgende kenmerken beoordeeld:

#### **Tarwe:**

- Lengte plant
- Bewassing aar en bovenste halmlid
- Aarvorm (inclusief speltoiden en compactoiden)
- Schakeling aar
- Gebaardheid (gebaard/ongebaard)
- Kleur (roodkaf/witkaf)

Speltoiden zijn planten die langer zijn (maar niet altijd 2 aar lengten), ruimer geschakeld en duidelijk piramidaal van vorm. Compactoiden zijn duidelijk kortere planten waarvan de aren zeer dicht geschakeld zijn.

#### **Gerst:**

- Lengte plant
- Bewassing aar en bovenste halmlid
- Aarvorm
- Schakeling aar
- Aantal aarrijen
- Anthocyaankleurig kafnaalden, oortjes en pakjes

Verdachte planten worden aanvullend beoordeeld op :

- Rachillabeharing
- Steriele pakjes (volledig ontwikkeld/rudimentair)

#### **Haver:**

- Lengte plant
- Bewassing pluim en bovenste halmlid
- Schakeling pluim
- Richting zijassen pluim (eenzijdig of alzijdig)
- Houding van de zijassen pluim

Verdachte planten worden aanvullend beoordeeld op:

- Bewassing toppakje
- Beharing bovenste knoop
- Bewimpering van de bladrand

### **Triticale**

- Lengte plant
- Bewassing aar en bovenste halmlid
- Aarvorm
- Schakeling aar
- Anthocyaankleur aar

Verdachte planten worden aanvullend op beharing van de nek en kelkkafjes beoordeeld

### **Erwten**

- Lengte plant
- Kleur plant (met of zonder anthocyaan)
- Blaadjes: aanwezig/afwezig (semi-bladloos)
- Kleur blaadjes en steunblaadjes
- Bewassing blaadjes en steunblaadjes
- Vorm blaadjes (afgerond, spits, smalbladig)
- Bloemkleur

Verdachte planten worden aanvullend beoordeeld op:

- Bloemgrootte
- Bladvlekken steunblaadjes
- Peulvorm

### **Veldbonen**

- Lengte plant
- Stengelkleur (met of zonder anthocyaan)
- Bladkleur
- Bewassing blad
- Bloemkleur

Verdachte planten worden aanvullend op peulvorm beoordeeld.

### **Landbouwstamboon**

- Lengte plant
- Planttype (rankend/niet rankend)
- Bladkleur
- Bladvorm
- Bloemkleur

Verdachte planten worden aanvullend beoordeeld op:

- Geribdheid blad
- Peulvorm

### **Blauwmaanzaad**

- Lengte plant
- Anthocyaankleur stengel
- Bewassing blad en stengel
- Bloemkleur
- Bewassing bol
- Vorm bol

Verdachte planten worden aanvullend beoordeeld op:

- Beharing stengel
- Betanding blad
- Vorm en kleur bloemvlek

## Vlas

Bij de keuring op raszuiverheid wordt gelet op de volgende kenmerken:

- de kleur van de kroonbladen (bloemkleur)
- de lengte van de plant
- de bloemvorm
- de bloemgrootte
- de kleurschakering van de kroonbladeren
- het al dan niet gevlekt zijn van de kelkbladen
- de beharing van de valse tussenschotten in de zaadbol.

In bijlage J staat een overzicht per ras van deze raskenmerken.

Voor de bloemkleur gelden voor de wit-, blauw-, roze-, rood- en violetbloeiende rassen de volgende normen:

<b>Te keuren als:</b>	<b>Max. aantal planten met afwijkende kleur kroonbladen per are</b>
Prebasiszaad	5
Basiszaad SE	5
Basiszaad E	10
Gecert. zaad 1 <sup>e</sup> vermeerdering	20
Gecert. zaad 2 <sup>e</sup> vermeerdering	50
Gecert. zaad 3 <sup>e</sup> vermeerdering	100

Percelen prebasiszaad, basiszaad super-elite en elite, gecertificeerd zaad 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> vermeerdering, die niet aan de gestelde eisen voldoen, kunnen met een lagere generatieaanduiding worden goedgekeurd indien ze aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. Percelen gecertificeerd zaad 3<sup>e</sup> vermeerdering die niet voldoen aan de gestelde eisen, worden afgekeurd.

Voor de keuring op de lengte, bloemvorm, bloemgrootte, kleurschakering bloem, gevlektheid van de kelkbladen en beharing van de valse tussenschotten, gelden de volgende normen:

<b>Te keuren als:</b>	<b>Monstergrootte</b>	<b>Max. aantal ras-afwijkende planten</b>
Prebasiszaad	500	2
Basiszaad SE	500	2
Basiszaad E	250	2
Gecert. zaad 1 <sup>e</sup> vermeerdering	200	4
Gecert. zaad 2 <sup>e</sup> vermeerdering	100	3
Gecert. zaad 3 <sup>e</sup> vermeerdering	100	3

De beharing van de valse tussenschotten wordt op het laboratorium aan de rijpe bollen beoordeeld. Bij percelen C1, C2 en C3 hoeft dit onderzoek niet te worden uitgevoerd, tenzij het zaad afkomstig is uit het buitenland of in België is geteeld of afgerepeld.

### 3.7.2 Normen raszuiverheid zelfbestuivende granen en peulvruchten

De normen voor raszuiverheid van zelfbestuivende granen en peulvruchten zijn als volgt:

Categorie	Maximaal aantal duidelijk ras-afwijkende planten per are		
	Tarwe Gerst Haver	Triticale	Peul- vruchten
Prebasiszaad	2	4	2
Basiszaad	7	10	5
Gecert. zaad 1 <sup>e</sup> vermeerdering	15	30	15
Gecert. zaad 2 <sup>e</sup> vermeerdering	30	60	30

### 3.7.3 Keuring kruisbestuivende gewassen

**Rogge, kanariezaad, karwij, koolzaad en mosterdzaad** worden als kruisbestuivende gewassen gekeurd. Bij de beoordeling op raszuiverheid wordt, voor zover het vrij constante eigenschappen betreft, dezelfde richtlijn aangehouden als voor de zelfbestuivende granen; de toegestane afwijking mag echter tweemaal zo groot zijn.

De beoordeling op raszuiverheid wordt voor of tijdens de bloei uitgevoerd. De raszuiverheid wordt aan de hand van de volgende kenmerken beoordeeld:

#### Rogge

- Lengte plant
- Bewassing plant en aar
- Schakeling aar
- Aarhouding

Verdachte planten worden aanvullend op nekbeharig beoordeeld.

#### Kanariezaad

- Lengte plant
- Bladkleur
- Bewassing plant en aar
- Aarvorm/grootte

#### Karwij

- Lengte plant
- Bladgrootte
- Bladkleur
- Anthocyaankleur blad en stengel
- Grootte bloemscherm
- Bloemkleur

De normen voor raszuiverheid zijn als volgt:

Categorie	Maximaal aantal afwijkende planten per are
Prebasis- en basiszaad	3
Gecertificeerd zaad	10

Bij selectie moeten de afwijkende planten voor de bloei worden verwijderd.

### 3.8 Keuring op plantenziekten

#### 3.8.1 Granen

##### a. Normen

Bij de granen zijn voor **steenbrand**, **stuifbrand** en **strepenziekte** de volgende normen vastgesteld:

Ziekte	PB en BZ	CZ
<b>Steenbrand</b> bij tarwe, gerst en triticale	1 per 5 are	1 per are
<b>Stuifbrand</b> bij tarwe, gerst en triticale	1 per are	6 per are
<b>Stuifbrand</b> bij haver	1 per 2 are	3 per are
<b>Strepenziekte</b> bij gerst	1 per 5 are	2 per are

Komen deze ziekten gecombineerd voor, dan is de ziekte die qua aantal zieke planten het ongunstigst is, bepalend voor de maximaal te behalen categorie.

Selectie van stuifbrandzieke planten is bij alle graangewassen verboden.

##### b. Voorwaardelijke goedkeuring prebasis- en basiszaad

Percelen prebasis- en basiszaad, die niet aan de eisen voor gezondheid voldoen, worden voorwaardelijk goedgekeurd. Bij voorwaardelijke goedkeuring moet ontsmetting tegen de ziekte waarvan de norm werd overschreden vóór de certificering plaatsvinden.

##### c. Besmettingsgevaar buurpercelen met stuifbrand

Verschillende rassen van tarwe, gerst, haver en triticale zijn vatbaar voor meerdere stuifbrandfysio's. Omdat bij de veldkeuring niet kan worden vastgesteld met welk fysio men te maken heeft, wordt aangenomen dat altijd besmettingsgevaar aanwezig is wanneer stuifbrand in een buurperceel voorkomt.

Voor **tarwe**, **gerst**, **haver** en **triticale** gelden daarom de volgende afstandseisen voor stuifbrand:

##### Prebasis- en basiszaad

Indien binnen 80 meter van een te keuren gewas een perceel met hetzelfde gewas voorkomt dat gevaar oplevert voor stuifbrandbesmetting, dan wordt afhankelijk van het besmettingsgevaar tot degradatie of afkeuring overgegaan.

### Gecertificeerd zaad

Indien binnen 30 meter van een te keuren gewas een perceel met hetzelfde gewas voorkomt dat gevaar oplevert voor stuifbrandbesmetting, dan moet het perceel worden afgekeurd als in het buurperceel de norm voor stuifbrand wordt overschreden.

### 3.8.2 Erwten

#### a. Amerikaanse vaatziekte

Percelen waarin Amerikaanse vaatziekte wordt aangetroffen, moeten worden afgekeurd.

#### b. Vroege verbruining

Percelen prebasis- en basiszaad moeten vrij zijn van vroege verbruining. De norm voor gecertificeerd zaad is maximaal 3 zieke planten per are. Selectie op vroege verbruining is niet toegestaan.

#### c. *Pseudomonas syringae* pv. *lisi*

Percelen prebasis- en basiszaad van erwten worden beoordeeld op het voorkomen van *Pseudomonas*. Indien deze ziekte wordt waargenomen moet dit op het veldkeuringsrapport worden vermeld.

### 3.8.3 Stambonen

Bij de **eerste keuring**, die tijdens de bloei plaatsvindt, moet worden gelet op primaire en secundaire aantasting van **vetvlekkenziekte** en **rolmozaïek**. Daarnaast wordt bij de eerste keuring een indruk verkregen van de aantasting door **vlekkenziekte** (*Colletotrichum*). Primair en secundair door rolmozaïek aangetaste planten worden alleen in de beoordeling betrokken, als ze zeer vroeg in het groeiseizoen zijn besmet en ernstig zijn aangetast. Hiervoor zijn de volgende normen vastgesteld:

Categorie	Maximaal aantal zieke planten per are
Prebasis- en basiszaad	2
Gecertificeerd zaad	10

Van primair vetvlekkenzieke planten mag maximaal 1 nest per ha voorkomen.

Bij de **tweede keuring**, die tijdens de afrijping plaatsvindt, wordt gelet op aantasting van de peulen en het zaad door **vetvlekkenziekte** en **vlekkenziekte**. Worden meer dan 5 planten per ha aangetroffen waarvan het zaad door vetvlekkenziekte is aangetast, dan wordt het perceel afgekeurd.

Voor **vlekkenziekte** geldt de volgende norm ten aanzien van het maximaal percentage peulen waarvan de helft of meer van de in de peul aanwezige zaden zichtbaar is aangetast:

Categorie	Maximaal percentage aangetaste peulen
Prebasis- en basiszaad	5%
Gecertificeerd zaad	15%

Bij de veldkeuring wordt ook gelet op het voorkomen van **brandvlekkenziekte** (*Xanthomonas phaseoli*) waarvoor dezelfde normen gelden als voor vetvlekkenziekte. Bij overschrijding van de norm wordt het perceel voorwaardelijk goedgekeurd. Een monster van

de betreffende partij moet worden onderzocht: al naar gelang de resultaten wordt de partij goed- of afgekeurd.

Voor **zwarteknopenziekte** moet het aantal haarden per ha op het veldkeuringsrapport worden vermeld.

### 3.9 Keuring op onkruid en vermenging

#### 3.9.1 Onkruiden

Indien in het perceel onkruiden voorkomen, die niet of moeilijk uitschoonbaar zijn, moet dit onder ‘Opmerkingen’ op het veldkeuringsrapport worden vermeld. Komen **vlasdolik** en **duist** in erge mate in vlas voor, dan moet dit op het keuringsrapport worden vermeld.

Percelen die wegens onkruidbezetting niet goed zijn te beoordelen worden afgekeurd.

#### Wilde haver in granen

Een perceel tarwe, gerst, haver, rogge, spelt en triticale wordt afgekeurd wanneer bij doorkruising van het perceel één of meer wilde haverplanten worden gevonden. Bij **gecertificeerd zaad** van **tarwe, gerst, rogge** en **triticale** is een extra keuring mogelijk, indien in eerste instantie bij doorkruising niet meer dan twee wilde haverplanten per ha worden aangetroffen.

#### 3.9.2 Vermenging met andere gewassen

Voor vermenging met andere gewassen, waarvan het zaad moeilijk of niet uitschoonbaar is, gelden de volgende normen:

Categorie	Maximaal aantal planten van andere gewassen
Prebasis- en basiszaad	1 per 5 are
Gecertificeerd zaad	2 per are <sup>1)</sup>

1) Bij gecertificeerd zaad is voorwaardelijke goedkeuring mogelijk, indien niet meer dan 6 planten per are voorkomen.

Opslag van andere gewassen, die geen of slechts onvolwaardig zaad kan geven, hoeft niet als een moeilijk uitschoonbare vermenging te worden gerekend.

## 4. Keuring hybride granen

### 4.1 Keuring chemisch hybride rassen van zelfbevruchtende granen

Bij chemisch hybride rassen wordt uitgegaan van rassen en/of lijnen die volgens de normale procedure als basiszaad zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Bij de productie van het hybride ras worden twee ouderrassen (of lijnen) in stroken naast elkaar geteeld. Van zowel de moeder- als de vadercomponent moet tenminste één strook worden geïdentificeerd. De keuring omvat de volgende onderdelen:

#### 4.1.1 Isolatie en scheiding

Tussen de stroken moeder- en vaderplanten moet een scheiding van tenminste 50 cm worden aangebracht om mechanische vermenging bij de oogst te voorkomen. Ten opzichte van andere rassen van hetzelfde gewas geldt een isolatieafstand van 25 m.

#### 4.1.2 Veldkeuring

De keuring op plantenziekten, onkruiden en vermenging kan op de normale wijze worden uitgevoerd. De moeder- en vaderstroken worden na het in aar komen normaal gekeurd op de hoofdkenmerken lengte, kleur en vorm. De norm voor raszuiverheid is gelijk aan die voor gecertificeerd zaad, te weten:

Gewas	Maximaal aantal rasafwijkende planten per are
Tarwe, gerst en haver	15
Triticale	30

In elke strook moederplanten moeten aren worden ingehuld door middel van papieren zakjes of gaasdoek tenten. Per perceel moeten 300 aren worden ingehuld na de gametocide bespuiting en voor de bloei. De eventuele mate van zelfbestuiving wordt voor de oogst gecontroleerd aan de hand van de ingehulde aren. Dit gebeurt door middel van telling van de eventueel aanwezige korrels die vervolgens worden uitgedrukt in procenten van het aantal korrels van 300 niet-ingehulde aren. Indien het aldus verkregen percentage zelfbestuiving groter is dan 5 wordt het perceel afgekeurd.

#### 4.1.3 Controle op hybridisatie

De controle op hybridisatie (= raszuiverheid) vindt plaats door middel van een electroforese-test. Uit het geoogste product wordt een monster genomen. De norm voor raszuiverheid is 90%. Daarnaast wordt een monster genomen voor uitzaai op het centraal controleveld.

#### 4.1.4 Monsteronderzoek en monster- en partijkeuring

Deze vinden op dezelfde wijze plaats als bij de conventionele rassen. De in het keuringsreglement genoemde normen voor kiemkracht, gezondheid, vochtgehalte enz. gelden ook voor hybride granen.

## 4.2 Keuring cytoplasmatisch hybride rassen van rogge

Bij de productie en keuring van hybride rogge worden cytoplasmatische mannelijke steriele moederlijnen in eerste instantie bestoven door fertiele vaderlijnen; daarbij blijft de cytoplasmatisch mannelijke steriliteit van de moeder gehandhaafd. Vervolgens wordt de nateelt van de

mannelijk steriele moeder gekruist met een zogenaamde 'hersteller' die de fertiliteit van de moederplanten herstelt. Deze opeenvolgende productiefasen worden als volgt gekeurd:

#### **4.2.1 Prebasiszaad**

De productie van de afzonderlijke componenten (cytoplasmatisch mannelijk steriele moeder, fertiele vader en de 'hersteller') vindt op het kweekbedrijf plaats. Als regel wordt deze productie van de componenten niet voor de keuring aangegeven.

#### **4.2.2 Basiszaad**

De productie van basiszaad bestaat uit twee onderdelen.

Eenzijds wordt de 'hersteller' afzonderlijk vermeerderd. De isolatieafstand ten opzichte van andere percelen rogge moet daarbij minstens 600 m bedragen. De veldkeuring kan op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij basiszaad van conventionele rassen. Ten aanzien van de raszuiverheid moet echter rekening worden gehouden met een vrij grote heterogeniteit als gevolg van het groot aantal lijnen waaruit de 'hersteller' is opgebouwd.

Het tweede onderdeel bestaat uit een strokenteelt waarbij de mannelijk steriele moeder gekruist wordt met de fertiele vader. Van elke component moet tenminste één strook worden geïdentificeerd.

Daarnaast gelden de volgende voorschriften:

##### **a. Scheiding**

Tussen de stroken moeder- en vaderplanten moet een scheiding van tenminste 50 cm worden aangebracht om mechanische vermenging bij de oogst te voorkomen.

##### **b. Veldkeuring**

De keuring op plantenziekten, onkruiden en vermenging wordt op de normale wijze uitgevoerd.

De moeder- en vaderstroken worden na het in aar komen normaal gekeurd op de hoofdkenmerken lengte, kleur en vorm. De norm voor raszuiverheid is gelijk aan die voor basiszaad te weten: max. 3 rasafwijkende planten per are.

Verder moet de mannelijke steriele moeder worden gekeurd op de mate van steriliteit. Deze moet minimaal 98% zijn, wat inhoudt dat niet meer dan 2% van de planten stuifmeel mag produceren.

##### **c. Nacontrole**

Beide componenten worden bij de nacontrole vergeleken met het standaardmonster van de betreffende component. De mannelijk steriele moeder mag niet meer dan 6 ‰ rasafwijkende planten bevatten; daarnaast moet de steriliteit tenminste 95% zijn. De resultaten van de nacontrole zijn mede bepalend voor de goed- of afkeuring van het gecertificeerde zaad dat het jaar daarop uit het betreffende basiszaad wordt geteeld.

### **4.2.3 Gecertificeerd zaad**

Het gecertificeerde zaad wordt verkregen door middel van een mengteelt van de mannelijk steriele moeder en de 'hersteller'. Voor de keuring gelden de volgende voorschriften.

De keuring op plantenziekten, onkruiden en vermenging vindt op dezelfde wijze plaats als bij conventionele roggerassen.

De keuring op raszuiverheid wordt uitgevoerd aan de hand van de hoofdkenmerken lengte, kleur en vorm. De norm voor raszuiverheid is max. 10 afwijkende planten per are. Bij de beoordeling moet wel rekening worden gehouden met de heterogeniteit van het gewas als gevolg van de mengteelt.

## 5 Keuring koolzaad

### 5.1 Voorvrucht

De teelt van zowel (pre)basiszaad als gecertificeerd zaad van hybride rassen mag alleen plaatsvinden op percelen waar de voorgaande vijf jaar geen Brassica's zijn verbouwd.

### 5.2 Tijdstip en aantal keuringen

Conventionele rassen worden minimaal twee keer gekeurd. Bij hybride rassen moeten tenminste drie veldkeuringen worden uitgevoerd.

Voor zowel conventionele als hybride rassen vindt de **eerste keuring** in het vegetatieve stadium plaats. Bij conventionele rassen wordt de **tweede keuring** tijdens de bloei uitgevoerd. Bij hybride rassen worden de **tweede** en **derde keuring** uitgevoerd aan het begin, respectievelijk het einde van de bloei.

Bij de **eerste keuring** wordt in het bijzonder gelet op:

- Bladvorm (heel- of gedeeldbladig; betanding)
- Bladgrootte
- Bladkleur
- Plantvorm
- Isolatieafstanden/scheiding
- Vermenging met andere Brassica's.

Bij de **tweede** en **derde keuring** wordt met name gelet op:

- Vroegheid
- Lengte plant
- Bloemkleur
- Bloemgrootte
- Steriliteit van de ms-lijn (bij hybride rassen)
- Isolatieafstanden/scheiding
- Vermenging met andere Brassica's.

### 5.3 Normen raszuiverheid

Voor raszuiverheid worden onderstaande normen gehanteerd. Bij selectie moeten de afwijkende planten voor de bloei worden verwijderd.

Conventionele rassen	Aantal afwijkers per are	
	PB en BZ	CZ
	3	10

Hybride rassen	Raszuiverheid in %	
	PB en BZ	CZ
Ingeteelde stammen (lijnen)	99,9	nvt
Enkelvoudige hybriden		
• mannelijke lijn	99,9	99,7
• vrouwelijke lijn	99,8	99,0
Mannelijke steriliteit	99%	98%

De mannelijke steriliteit wordt beoordeeld door minimaal 4 x 100 bloemen te bekijken op het ontbreken van fertiele helmknoppen.

#### 5.4 Nacontrole hybride rassen

Basiszaad moet worden nagecontroleerd; alleen als blijkt dat aan bovengenoemde normen voor basiszaad wordt voldaan, komt de nateelt voor certificering als CZ in aanmerking. In plaats van een nacontrole kan de raszuiverheid ook door middel van een biochemische test worden onderzocht.

#### 5.5 Samenstelling mengras (rasassociatie)

Gecertificeerd zaad van mengrassen wordt samengesteld door de ouderlijnen mechanisch te mengen in de verhouding zoals opgegeven door de kweker. De zaadcoating van de vrouwelijke component wordt anders gekleurd dan die van de mannelijke component.

## 6. Keuring vezelhennepe

### 6.1 Algemeen

Voor zover niet anders bepaald in deze aanwijzing worden aangifte, keuring, bemonstering, monsteronderzoek en certificering van vezelhennepe uitgevoerd overeenkomstig de regels en voorschriften voor granen enz. zoals vastgelegd in het keuringsreglement en de aanwijzing van de NAK.

De aangifte voor de keuring moet plaatsvinden voor 1 juni.

Eenhuizige vezelhennepe kan worden gekeurd in de categorieën prebasiszaad, basiszaad, gecertificeerd zaad 1<sup>e</sup> vermeerdering en gecertificeerd zaad 2<sup>e</sup> vermeerdering.

Tweehuizige vezelhennepe kan worden gekeurd in de categorieën prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad.

### 6.2 Veldkeuring

Vezelhennepe wordt minimaal tweemaal gekeurd. Eenmaal in het vegetatieve stadium rondom het sluiten van het gewas en vlak voor of tijdens de bloei.

Bij de veldkeuring worden de volgende onderdelen beoordeeld:

- rasechtheid
- raszuiverheid
- isolatieafstanden.

Bij de beoordeling op raszuiverheid wordt gelet op planten die duidelijk van het ras afwijken (inclusief mannelijke tweehuizige planten in een eenhuizig ras). De afwijkende planten moeten voor de bloei worden verwijderd. De normen voor raszuiverheid zijn:

Categorie	Maximaal aantal afwijkers per are
Prebasis- en basiszaad	3
Gecertificeerd zaad (1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> vermeerdering) <sup>*)</sup>	10

<sup>\*)</sup> Voor gecertificeerd zaad 2<sup>e</sup> vermeerdering van eenhuizige rassen is de norm voor mannelijke tweehuizige planten 1%.

## 7. Veldkeuring maïs

### 7.1 Aangifte

Bij de aangifte moet de kweker opgeven of de teelt betrekking heeft op een:

- inteeltlijn
- enkele hybride
- drieweg hybride
- dubbele hybride

Verder moet hij een beschrijving geven van de inteeltlijn, het ras, de kruisingsouders en de kruisingsformule. Onder de kruisingsouders worden de geniteurs verstaan waaruit een maïsras is opgebouwd, zoals inteeltlijnen en enkele hybriden. De beschrijvingen kunnen worden verstrekt op bijgevoegd formulier.

### 7.2 Veldkeuring

Bij de veldkeuring van maïs wordt gelet op de volgende onderdelen:

- rasechtheid
- raszuiverheid
- isolatieafstanden.

De veldkeuringen worden uitgevoerd in de periode vanaf het zichtbaar worden van de eerste pluimen tot het einde van de bloei. Bij de eerste keuring wordt met name gekeken naar de isolatieafstanden, vroege planten en vegetatieve kenmerken. Bij de volgende keuringen wordt gelet op raszuiverheid en, voorzover van toepassing, ontpluiming van de vrouwelijke kruisingsouder.

#### Rasechtheid

Bij de beoordeling op rasechtheid moeten de kruisingsouders overeenkomen met de opgegeven beschrijving of de officiële rasbeschrijving indien deze bestaat.

#### Raszuiverheid

Bij de keuring op raszuiverheid wordt gelet op rasafwijkende planten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende kenmerken:

- Vroegheid
- Lengte plant
- Anthocyaan op de stengel
- Anthocyaan op de stijlen
- Hoogte kolfaanzetting
- Kleur van de pluim
- Vorm van de pluim (vertakking en hoek tussen hoofd- en zijassen)

De normen voor raszuiverheid zijn:

Categorie	Aantal afwijkers
Prebasis- en basiszaad	1 per 1000
Gecertificeerd zaad	2 per 1000

Bij de vrouwelijke kruisingsouder wordt bovendien gelet op het voorkomen van mannelijke bloeiwijzen (pluimen). Wanneer 5% of meer planten van de vrouwelijke kruisingspartner bevrucht kunnen worden, mag het percentage aan planten van die vrouwelijke kruisingspartner, die stuifmeel hebben afgegeven of afgeven, niet meer bedragen dan:

- 1% bij elke veldkeuring
- 2% over alle veldkeuringen samen.

Elke complete of gedeeltelijke mannelijke bloeiwijze wordt geteld als stuifmeelleverende bloeiwijze, wanneer op totaal 5 centimeter pluim de helmhokken zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor uitgetrokken pluimen in of in de onmiddellijke nabijheid van het gewas.

### **7.3 Isolatieafstanden**

Voor alle categorieën geldt een isolatieafstand van 200 m ten opzichte van andere rassen en andere inteeltlijnen. Deze afstand hoeft niet in acht te worden genomen bij percelen met dezelfde bestuiver (vaderlijn). Bij teelt in kassen is geen isolatieafstand vereist mits de percelen onderling door een gesloten tussenwand zijn gescheiden. Verschil in zaaitijd of bloeitijdstip kan onder geen voorwaarde als middel tot isolatie worden geaccepteerd.

Als de afstand voor isolatie minder bedraagt dan 200 meter maar meer dan 150 meter, dan kan dit voor kruisingen gecompenseerd worden door aan de zijde, onmiddellijk aansluitend aan het voor keuring aangegeven gewas, voor elke 10 meter of een gedeelte daarvan die aan de vereiste afstand ontbreekt een extra rij van de vader te zaaien. De planten van de extra rijen moeten stuifmeel leveren als de moederplanten ontvankelijk zijn.

Wordt voor de productie van enkele, dubbele of rassenhybriden dezelfde vader gebruikt als bij de productie van overeenkomstige hybriden op buurpercelen, dan is geen onderlinge isolatie vereist. Wordt het buurperceel afgekeurd op grond van onvoldoende verwijderen van mannelijke bloeiwijzen, dan moet het andere perceel ook worden afgekeurd;

### **7.4 Partijkeuring hybride maïs**

Zaad van ingeteelde stammen, van enkele en dubbele hybriden en van rassenhybriden, wordt ongedorst op partij gekeurd. De normen voor afwijkende kolven zijn daarbij als volgt:

- Prebasiszaad en basiszaad : max 1‰ duidelijk afwijkende kolven
- Gecertificeerd zaad : max 2‰ duidelijk afwijkende kolven.

## 8. Keuring standaardzaad van landbouwstambonen

1. Percelen, bestemd voor de productie van standaardzaad, moeten als regel **vóór 1 juni** bij de NAK voor registratie worden aangemeld. Daarbij moeten de certificaten van het gebruikte uitgangsmateriaal worden ingeleverd.
2. Alleen percelen ingezaaid met basiszaad of gecertificeerd zaad kunnen als standaardzaad onder toezicht worden genomen.
3. Het bedrijf moet:
  - van de aangevoerde, opgeslagen, bewerkte en afgeleverde partijen standaardzaad een nauwkeurige administratie voeren, die tenminste gedurende drie jaar moet worden bewaard en op verzoek van de NAK ter inzage moet worden verstrekt
  - monsters van elke partij nemen en deze monsters tenminste gedurende twee jaar ter beschikking van de NAK houden.

De NAK neemt steekproefsgewijs monsters voor controle achteraf.

4. Het onder 3 gestelde is niet van toepassing indien op verzoek van het bedrijf:
  - de aanvoer, de opslag en bewerking onder toezicht van de NAK plaatsvinden
  - de NAK het monster onderzoekt en de partij plombeert.

Wel moet het bedrijf een administratie voeren overeenkomstig de eisen, die voor gecertificeerd zaad gelden. In dit geval neemt de NAK steekproefsgewijs monsters voor nacontrole op rasechtheid en raszuiverheid.

5. Voor standaardzaad gelden voor de kiemkracht, zuiverheid en uiterlijke kwaliteit de normen voor gecertificeerd zaad 1<sup>e</sup> vermeerdering. Verder moet standaardzaad voldoen aan de normen, zoals die in de EU-richtlijn voor groentezaad zijn aangegeven.
6. Het bedrijf moet het standaardzaad voorzien van een doorlopend genummerde, donkergele label (model 8).
7. Bij bemonstering voor een internationaal oranje attest moet de NAK de partij met een plombe of een identificatielabel sluiten.

## 9. Keuring boekweit

### 9.1 Algemeen

Ten behoeve van OESO-certificering kan de NAK op verzoek van een bedrijf boekweit te velde keuren. Aangifte en keuring worden uitgevoerd overeenkomstig de regels en voorschriften voor granen enz. zoals vastgelegd in het keuringsreglement en de aanwijzingen van de NAK.

Boekweit wordt gekeurd in de categorieën prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad.

Prebasis- en basiszaad worden als regel tenminste tweemaal gekeurd. De keuringen moeten zodanig worden uitgevoerd dat alle onderdelen goed zijn te beoordelen. Gecertificeerd zaad wordt als regel éénmaal gekeurd op het moment dat het gewas in bloei c.q. pluim staat.

Bij de veldkeuring worden de volgende onderdelen beoordeeld:

- rasechtheid
- raszuiverheid
- zaadgebonden plantenziekten
- isolatieafstanden
- onkruiden en vermengingen die moeilijk uitschoonbaar zijn

### 9.2 Veldkeuring boekweit

#### 9.2.1 Keuring raszuiverheid

Boekweit wordt gekeurd als een kruisbestuivend gewas. Bij de beoordeling op raszuiverheid wordt, voorzover het vrij constante eigenschappen betreft, dezelfde richtlijn aangehouden als voor de zelfbestuivende granen; de toegestane afwijking mag echter tweemaal zo groot zijn. De eerste veldkeuring van prebasis- en basiszaad wordt uitgevoerd in het vegetatieve stadium. Daarbij wordt met name gelet op bladkleur en bladgrootte. De tweede keuring van prebasis- en basiszaad en de eenmalige keuring van de categorie CZ wordt uitgevoerd tijdens de bloei. Daarbij worden de volgende kenmerken beoordeeld:

- Vroegheid
- Lengte plant
- Bloemkleur
- Bloemgrootte

De normen voor raszuiverheid zijn als volgt:

Categorie	Maximaal aantal afwijkers per are
Prebasis- en basiszaad	3
Gecertificeerd zaad	10

Bij selectie moeten de afwijkende planten voor de bloei worden verwijderd.

### **9.2.2 Onkruiden en vermenging**

In verband met het gevaar op kruisbestuiving zijn voor planten van Franse boekweit (*Fagopyrum tartaricum*) de volgende normen gesteld:

- Prebasis- en basiszaad: 1 plant/2 are
- Gecertificeerd zaad: 1 plant/are

Indien in het perceel onkruiden voorkomen die niet of moeilijk uitschoonbaar zijn, moet dit onder 'Opmerkingen' op het veldkeuringsrapport worden vermeld. Dit betreft met name de soorten zwaluwtong en winde.