

5. Andere factoren

5.1 Algemeen

Bij de beoordeling van de andere factoren wordt gelet op al die omstandigheden die de keuring kunnen beïnvloeden, de hoedanigheid van het pootgoed mede bepalen en de algemene indruk vestigen.

In het bijzonder wordt hierbij gelet op:

- In hoeverre is voldaan aan het bepaalde in artikel 18.1 en 18.2 KR (Bevorderen kwaliteit keuring);
- De bemestingstoestand van het perceel;
- Het optreden van opslag;
- Het primair optreden van virusziekten;
- Eventueel andere ziekten en beschadigingen;
- De rijpingstoestanden en de gelijkmatigheid van het gewas;
- Het besmettingsgevaar van de omgeving;
- Onderzeeërs.

Bij het classificeren van de percelen wordt met de hierboven genoemde factoren rekening gehouden. Zij kunnen ieder voor zich of gezamenlijk aanleiding zijn om een perceel af te keuren, in een lagere klasse te plaatsen of voor eigen teelt goed te keuren.

5.2 Opslag en vermenging

Voor opslag en vermenging (raszuiverheid) gelden de volgende normen:

Klasse	Opslag zelfde ras	Vermenging en opslag ander ras ¹⁾
S	0,025% ¹⁾	0
SE	0,05% ¹⁾	0
E	0,1% ¹⁾	0
A	n.v.t.	0,05%, waarvan max. 0,01% vermenging
C	n.v.t.	0,5%, waarvan max. 0,2% van een ander ras

¹⁾ Tijdens de 1^e keuring is sporadisch (max. 5 pl/ha) vermenging (incl. opslag ander ras) toegestaan in de klassen S, SE en E. Opslag van een ander ras wordt beschouwd als vermenging. Opslag van hetzelfde ras in de klassen S, SE en E wordt beschouwd als bont (mozaïekzieke planten). Mutanten worden als rasonzuivere planten beschouwd.

Een perceel dat is verlaagd vanwege vermenging, kan na opschoning weer in een hogere klasse worden geplaatst.

5.3 Primair

5.3.1 Klasse S, SE en E

Wanneer bij de laatste keuring voor loofvernietiging sporadisch primair symptomen worden geconstateerd wordt het perceel gedeclasseerd naar de klasse A.

Wanneer bij de keuring ongeacht het tijdstip meer dan sporadisch primair wordt geconstateerd dan kan het perceel niet meer als basispootgoed worden goedgekeurd en vindt verdere classificatie plaats overeenkomstig de voor het gecertificeerde pootgoed gevolgde werkwijze.

N.B.: Van sporadisch primair is sprake indien bij het doorkruisen van een perceel maximaal 5 primair viruszieke planten, dan wel 5 kleine haardjes van dergelijke planten, worden waargenomen.

5.3.2 Klasse A en C

In gecertificeerd pootgoed wordt primair gelijkgesteld aan (secundair) zwaar bont, resp. bladrol. Keuring vindt plaats op basis van de hiervoor geldende normen.

5.4 Onderzeeërs

Percelen pootaardappelen, waarin onderzeeërs voorkomen, kunnen na opschoning overeenkomstig de normen worden gekeurd en geclassificeerd.

Percelen pootaardappelen, waarin onderzeeërs voorkomen kunnen, ingeval het perceel niet wordt opgeschoond, worden gekeurd volgens de normen. Hierbij geldt echter:

- maximaal klasse A bij minder dan 20% onderzeeërs en
- maximaal klasse C bij meer dan 20% onderzeeërs;
- het geogste pootgoed beneden de 28 mm komt niet voor certificering in aanmerking;
- bij onderzeeërs groter dan 28 mm dient de ondergrens groter te zijn dan 28 mm en deelbaar te zijn door 5; dus de eerstvolgende toegestane ondergrens boven de 28 mm is 30 mm.

Op het keuringsformulier moet verder aantekening plaatsvinden betreffende de aanwezigheid van onderzeeërs met vermelding van de grootste maat hiervan.

Partijen, waarbij sprake is van onderzeeërs in de sortering 28 mm en hoger en die zijn aangehouden, kunnen eventueel na 1 januari voor certificering in aanmerking komen.

5.5 Eigen gebruik

Percelen die op grond van “andere factoren”, met uitzondering van primair, in een lagere klasse worden geplaatst of afgekeurd, kunnen voor eigen gebruik worden goedgekeurd, mits de percelen voldoen aan de overige eisen voor de betreffende klasse.